

PPD - Mantoux - Prueba de Tuberculina

(Indicaciones para pacientes)

Se sugiere consultar con su médico antes de realizar la prueba de la tuberculina en los siguientes casos:

- Si sabe por otro test anterior que se ha infectado por la bacteria de la tuberculosis, ya que podría producirse una fuerte reacción en la zona de la inyección.
- Si se ha vacunado recientemente contra el sarampión, parotiditis y rubeola, o con vacunas basadas en virus vivos, ya que puede verse disminuida la reacción a la tuberculina lo que puede dar lugar a falsos negativos. Se sugiere esperar de 4 a 6 semanas tras la vacunación.

Realización de la prueba:

El profesional asignado le administrará la solución de tuberculina mediante una inyección en la capa superficial de la piel en la cara anterior de uno de sus brazos y hará una marca para señalar la zona de la colocación.

Posteriormente la zona podrá enrojecerse y al cabo de unas horas podría aparecer una induración (ligera elevación de la piel con un habón).

- NO se frote ni se rasque.
- NO se coloque curitas ni nada que pueda afectar la lectura de los resultados.

Transcurridas 48-72 horas, debe volver al laboratorio para que se examine la reacción en la piel y así obtener los resultados de la prueba.

ACLARACIÓN: Después de 72 hs se espera que el tamaño de la induración disminuya. Estas reacciones en la piel son normales y propias de la prueba que le están realizando.

